


Standortskarte Lehrforst
 Revier Pernitz Teil Ofenbach
 1:10000
 Stand: 1985



Standortstypen

Auf stark geneigten Hängen	Auf mässig geneigten Hängen
1 Podsolige Braunerde bis Semipodsol	10 Pseudogley
1a Variante auf Braunlehm	Talböden
2 Podsolige Braunerde bis oligotrophe Braunerde	11 Schwemböden oder Gley
Auf mässig geneigten Hängen	Gräben mit steilen Einhängen
3 Semipodsol	12 Braunerde bis Hangpseudogley
4 Podsolige Braunerde	Gräben oder Quellmulden
4a Variante auf Braunlehm	13 Gley oder Stagnogley
5 Oligotrophe bis mesotrophe Braunerden	Auf Karbonat
5a Variante auf Braunlehm	14 Mittelgründige Rendsina
6 Pseudovergleyte Braunerde	15 Seichtgründige Rendsina
6a Variante auf Braunlehm	16 Seichtgründige Rendsina
7 Pseudogley	17 Tiefgründige Rendsina mit Braunlehm
7a Variante auf Braunlehm	18 Karbonatischer Braunlehm
In schwach geneigten Lagen	
8 Podsolige Braunerde	
9 Braunerde	
9a Variante auf Braunlehm	

1:10000
 0 100 200 300 400 500 1000
 Meter